

**MAXIMIZA  
EL POTENCIAL  
GENÉTICO.**

**ActiGen**<sup>®</sup>  
MÁS CALIDAD. MAYOR CALIBRE

**Programa  
Kiwis**



# INICIO DE BROTACIÓN

PRIMAVERAS HÚMEDAS

PRESENCIA DE CANCROS O BACTERIOSIS

ESTRÉS POR FRÍO


## RESULTADOS

REDUCE EL ESTRÉS ABIOTICO

SANIDAD DE HUERTO

PREVENCIÓN

**Aplicación opcional en programa (alta presión de patógenos)**



### Momento de aplicación

Inicio de brotación (inicios de Octubre)

### Dosis y Forma

5 litros /Ha foliar (mojamiento de 750 litros de agua/Ha).

# PRE FLOR

PRIMAVERAS  
HÚMEDAS

PRESENCIA DE  
CANCROS O  
BACTERIOSIS

ESTRÉS POR FRÍO

**Aplicacion fija en programa**



# RESULTADOS

REDUCE EL ESTRÉS ABIOTICO

SANIDAD DE HUERTO

PREVENCIÓN

## Momento de aplicación

**Pre flor o Brote de 20 cm**  
(fines de Octubre)

## Dosis y Forma

5 litros /Ha foliar  
(mojamiento de 750 litros de agua/Ha).

# FLORACIÓN

COMPETENCIA DE  
CARBOHIDRATOS

ESTRES BIÓTICO  
ABIÓTICO

ESTATUS HÍDRICO  
DEL HUERTO

Aplicación fija en programa



# RESULTADOS

MEJORA LA HIDRACIÓN DE LA  
PLANTA

SANIDAD DE HUERTO

AUMENTA LA FOTOSÍNTESIS Y  
REDUCE EL ESTRÉS POR  
AZUCARES EN FLORACIÓN

## Momento de aplicación

### Floración

15- 20 días después de primera  
aplicación  
(mediados de Noviembre)

## Dosis y Forma

7 litros/Ha al suelo (riego tecnificado)  
ó  
5 litros /Ha foliar (mojamiento de  
750 litros de agua/Ha).

# DESARROLLO DE FRUTO

PERÍODO DE MÁXIMO CRECIMIENTO DE FRUTO

ESTRÉS HÍDRICO

**Aplicacion fija en programa**



# RESULTADOS

MEJOR CALIBRE Y PESO FRUTO

REDUCE ESTRÉS HÍDRICO (FRUTOS ALARGADOS)

SANIDAD DE HUERTO

## Momento de aplicación

**Desarrollo de fruto**  
15- 20 días después de segunda aplicación  
(inicios de diciembre)

## Dosis y Forma

7 litros/Ha al suelo (riego tecnificado)  
ó  
5 litros /Ha foliar (mojamiento de 750 litros de agua/Ha).



## ETAPA DE ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA

EXCESO DE RADIACIÓN Y TEMPERATURA

ESTRÉS HÍDRICO

COMPETENCIA POR CARBOHIDRATOS

## RESULTADOS

MEJORA LA ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA DEL FRUTO

REDUCE EL ESTRÉS HÍDRICO Y TÉRMICO

**Aplicación opcional en programa (veranos cálidos)**

### Momento de aplicación

**Etapa de acumulación de Materia seca**  
(Mediados de Enero)

### Dosis y Forma

7 litros/Ha al suelo (riego tecnificado)  
ó  
5 litros /Ha foliar (mojamiento de 750 litros de agua/Ha).